



**KLEINDIER**  
MAGAZINE



# Vaccinatieschema voor diergroep konijnen



Kleindier Liefhebbers Nederland

[www.kleindierliefhebbers.nl](http://www.kleindierliefhebbers.nl)

dierenarts vaccineert aan huis voor  
begin tentoonstellingsseizoen

engelse hangoren  
blij na de enting

[kleindierliefhebbers.nl](http://kleindierliefhebbers.nl)

[kleindierliefhebbers.nl](http://kleindierliefhebbers.nl)





konijn ligt klaar voor de vaccinatie MYXOMATOSE



dierenarts en de konijnen



verzamenen voor de verplichte RVHD enting



MYXOMATOSE entstoffen



huisbezoek dierenarts: samen de verplichte RVHD enting uitvoeren



verplichte entverklaring na de vaccinatie

## Tijdens opfok en tijdens fokprogramma en/of tentoonstellingsseizoen:

Muggen en vliegen bestrijden door o.a. nestkastjes voor vleermuizen op te hangen en ingangen voor zwaluwnesten beschikbaar stellen.

### Myxomatose:

2 x injectie met Lyomyxovax met 6 weken tussentijd, herhalen halfjaarlijks bij alle fokdieren voor begin van fokseizoen met Lyomyxovax.

of

2 x injectie met Dervaximyx SG33 met 6 weken tussentijd, herhalen elke 4 maanden bij alle fokdieren voor begin van fokseizoen met Dervaximyx SG33.

of

1 x injectie met Nobivac Myxo-RHD vanaf 5 weken leeftijd, herhalen elk jaar bij alle fokdieren voor begin van fokseizoen met Nobivac Myxo-RHD.

### RVHD: Rabbit Viral Haemorrhagic Disease:

#### RVHD type 1:

elk half jaar injectie met Arvilap

of

elk jaar injectie met Nobivac Myxo-RHD

#### RVHD type 2:

injectie met Eravac vanaf 30 dagen leeftijd en dan elke 8 maanden herhalen met injectie met Eravac of

2 x injectie met Filavac VHD k c+v met 6 weken tussentijd, herhalen jaarlijks bij alle fokdieren voor begin van fokseizoen injectie met Filavac VHD k c+v.

Download : [www.kleindierliefhebbers.nl](http://www.kleindierliefhebbers.nl): entverklaring RVHD

#### Snot: Pasteurella, Bordetella

2 x injectie met Cunivak Past met 6 weken tussentijd, eventueel herhalen 1 x injectie zes weken voor het tentoonstellingsseizoen begint met Cunivak Past.

#### Dikke buiken ziekte: enterocolitis: Clostridium

2 x injectie met Cunivak ENT met 6 weken tussentijd, eventueel herhalen 1 x injectie voor begin van het fokseizoen met Cunivak ENT of 1 x injectie 6 weken voor het tentoonstellingsseizoen begint met Cunivak ENT.

Drs H.T. Arts, dierenarts KleindierLiefhebbers Nederland. KLN. 4 oktober 2018.



RVHD type 2 entstoffen

## Aanpak van parasitaire aandoeningen van belang voor goede groei van de opfok jonge konijnen:

### Clostridium: enterocolitis: dikke buikenziekte:

- door het drinkwater bacitracine (Bacivet-S) geven tijdens risicoleeftijden en risicoseizoenen.
- voldoende NDF fractie (Neutral Detergent Fibre) ofwel voldoende ruwvezel en ruwe celstof in de voeding.

### Coccidiose:

- elke week mest uit de hokken verwijderen, eventueel ontsmetten daarna met cresol (Neopredisan) spray of met ammoniak spray in de hokken.
- behandelen vanaf 4 weken leeftijd 1 dag per week met Baycox 2,5% of Dozuril 2,5% door het drinkwater, of Baycox 50 mg/ml of Dozuril pig ingeven in de bek, of 1 dag per week Sulfapreparaten (sulfadimidine, sulfaquinoxaline) in het drinkwater, of 2 dagen per week Coccibal (amprolium) in het drinkwater.
- Eventueel konijnenvoer geven met coccidiostaticum in het voer gemengd (Robenidine 66 ppm of Clinacox (diclazuril) 1 ppm)

### Wormen:

- elke week mest uit de hokken verwijderen, eventueel ontsmetten daarna met cresol (Neopredisan) of met ammoniak spray in de hokken.
- behandel de opfokdieren elke 6 weken met ontwormmiddel met Panacur als pasta in de mond of als Panacur aquasol in het drinkwater, of met Vitaminthe pasta in de mond of met Flubenol pasta in de mond.
- behandel de konijnen voor begin van de fokkerij voor het fokseizoen tegen wormen.

### Mijten: oormijten, vachtmijten:

- konijnen voor de tentoonstelling behandelen met ivermectine (Ivomec 1% injectie Iverveto 1% injectie of Noromectin pour on druppelen in de nek op de huid of Ivomec pour on druppelen in de nek op de huid)
- tijdens of na behandeling de hokken goed schoonmaken en met bladblazer haren en stof verwijderen.

### Myiasis: maden van vliegen in de vacht en huid:

- goed de huid en haren schoonhouden van ontlasting, vooral bij anus en achterhand.
- vliegen bestrijden met vliegengaas voor de ingang van de hokken.
- eventueel konijnen behandelen met Deltanil pour on druppels op de huid.
- eventueel de omgeving sprayen met Elector of met Neocidol, konijnen mogen aanwezig blijven tijdens deze behandeling.

Drs H.T. Arts, dierenarts KleindierLiefhebbers Nederland. KLN. 4 oktober 2018.